

El Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra en alerta y ha reforzado las medidas de prevención tendientes a evitar el ingreso del pequeño escarabajo de la colmena (*Aethina tumida*), insecto que ya fue detectado en la zona de Cochabamba, Bolivia.

El pequeño escarabajo de las colmenas -también conocido como PEC- ha tenido un rápido desplazamiento por el cono sur: se detectó en Brasil en 2016; en Colombia en 2018; y en Paraguay y Bolivia en 2022, aumentando la presión de ingreso a nuestro país.

Ante este escenario, el SAG reitera a todos los pasajeros/as la importancia de no ingresar productos que puedan poner en riesgo la sanidad de nuestra agricultura y medio ambiente; invitándolos a poner especial atención con los productos de origen apícola, materiales de uso en apicultura y todo tipo de frutas que pueda portar las larvas del pequeño escarabajo de la colmena.

Chile está libre de esta plaga, y su ingreso podría provocar un grave daño al sector apícola y al ecosistema de nuestro país, con pérdidas de colmenas y del posicionamiento global que el país mantiene en materia sanitario apícola.

El SAG ya se encuentra trabajando en las acciones de prevención, reforzando las actividades en los controles fronterizos; fortaleciendo la vigilancia, instalando trampas en apiarios en zonas de mayor riesgo (apiarios centinelas), activando planes de fiscalización complementarios a ingresos ilegales de productos por pasos no habilitados y masificando la alerta entre los apicultores/as del país.

Producto de los serios efectos que esta plaga puede generar, el SAG hace un llamado a los apicultores y apicultoras a denunciar de inmediato al Servicio la sospecha de la presencia del PEC escribiendo a [oficina.informaciones@sag.gob.cl](mailto:oficina.informaciones@sag.gob.cl) o contactándose con la oficina SAG más cercana, así como a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de internación ilegal de productos que puedan poner en riesgo la favorable condición sanitaria del país.



**Imagen I.** *Aethina tumida* adulto y *Apis mellifera*. en panal.

Fuente: <https://www.latiendadelapicultor.com/blog/escarabajo-de-la-colmena/>



**Imagen II.** Larvas de *Aethina tumida*. en panal. Fuente: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aethina\\_tumida\\_5025044.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aethina_tumida_5025044.jpg)

### **Fuentes de infección:**

- Vuelo activo del propio escarabajo.
- Colonias de abejas infestadas.
- Productos de panales infestados.
- Productos vegetales y otros alimentos no precisamente asociados a las abejas

**Conoce más de esta plaga [aquí](#)**